


ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΓΛΥΚΟΓΟΝΟΥ




Βιοχημεία
Garrett & Grisham

Κεφ 22



Lehninger's
ΑΡΧΕΣ
ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ


§15.4



ΠΑΝ. ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΚΡΗΤΗΣ


STRYER ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ

Κεφ 21



STRYER
Βιοχημεία-Βασικές Αρχές

Κεφ 24



BROKEN HILL
PUBLISHERSLTD

Βασική Βιοχημεία
ΣΕΛ 374, 390 (κεφαλαιο ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ
ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΩΝ

- ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ
ΓΛΥΚΟΓΟΝΟΥ






FIGURE 15-26 Glycogen granules in a hepatocyte. Glycogen granules appear as electron-dense particles, often in aggregates or rosettes associated with tubules of the smooth endoplasmic reticulum. Five mitochondria are also


ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΓΛΥΚΟΓΟΝΟΥ

- Ήπαρ (10% w/w)
- Μύες (2% w/w).
- Η συνολική ποσότητα γλυκογόνου στους μύες είναι περισσότερη εξαιτίας της μεγαλύτερης συνολικής μάζας τους.

Το γλυκογόνο αποθηκεύεται σε **μεγάλα κοκκία (α-ροζέτες) στο κυτταρόπλασμα.** Κάθε ροζετα σχηματίζεται από 20-40 **β -σωματίδια** (των 55 000 μοναδών γλυκόζης)



Electron micrograph of a glycogen granule from rat skeletal muscle



**ο μεσος ανθρωπος καταναλωνει
ημερησίως :**

20-160 gr γλυκόζης

20 gr στο αίμα

75 % καταναλώνει ο εγκέφαλος

180-200 gr αποθηκευση σε γλυκογονο

ΓΙΑΤΙ Η ΓΛΥΚΟΖΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΕΤΑΙ ΩΣ ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ;

Η συγκέντρωση του γλυκογόνου στο ήπαρ είναι
0.01 μM

Η συγκεντρωση της ελευθερης γλυκόζης θα ήταν
0.4M

- Μυϊκά κύτταρα –Τύπου I (slow-switch) :
φτωχά σε γλυκογόνο -



κόκκινο κρέας


- Μυϊκά κύτταρα –Τύπου II (fast switch):
πλούσια σε γλυκογόνο.



λευκό κρέας

- **Μυϊκά κύτταρα –Τύπου I (slow-switch) :**
φτωχά σε γλυκογόνο

- πλούσια σε μυογλοβίνη και μιτοχόνδρια (αίμη)
- ήπια γλυκόλυση
- **(κόκκινο κρέας)**



*Ιχνώση του
x 96, transverse*

- **Μυϊκά κύτταρα –Τύπου II (fast switch):**
πλούσια σε γλυκογόνο.

- φτωχά σε μυογλοβίνη και μιτοχόνδρια
- έντονη γλυκογονόλυση
- έντονη γλυκόλυση (πρός γαλακτικό)
- **(λευκό κρέας)**

- **Το γλυκογόνο δεν έχει τόση ενέργεια όση τα λίπη
(διότι είναι λιγότερο αναγμένο)**

**Ωστόσο, είναι σημαντική αποθήκη
καυσίμου (ενέργειας) διότι:**

1. Η γλυκόζη του γλυκογόνου είναι **άμεσα διαθέσιμη**.
3. Η γλυκόζη είναι **το μόνο καύσιμο για τον εγκέφαλο,
εκτός από περιόδους παρατεταμένης νηστείας**
- 4. Η γλυκόζη μπορεί να δώσει ενέργεια
απουσία οξυγόνου, σε αντίθεση με τα λιπ. οξέα.**


Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΣ ΣΤΟ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟ ΤΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ

(Claude Bernard, 1848–1860)




Fig. 1. Portrait of Claude Bernard (1).


- «Carbohydrates could be stored in the liver as a polysaccharide “glycogen”.




- «Το ήπαρ μπορεί και παράγει, γλυκόζη, ακόμη και όταν:
 - δεν προέρχεται από την τροφή.
 - Έχει καταναλώσει το γλυκογόνο»



Γλυκονεογένεση





Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΓΛΥΚΟΓΟΝΟΥ



ΜΗ-ΑΝΑΓΩΓΙΚΑ ΑΚΡΑ

Nonreducing end





β-σωμάτια :

55K γλυκόζης και 2100
(μη-αναγωγικά) άκρα,
περίπου

ΑΝΑΓΩΓΙΚΑ ΑΚΡΑ


Η ελεύθερη - CHO ομάδα της γλυκόζης οξειδώνεται από οξειδωτικούς παράγοντες, όπως δια/τα χαλκού (δια/μα Fehling)*.




* ή τα διάλυμα *Tollens*, *Benedict*, *Barfoed*

ΑΝΑΓΟΝΤΑ ΣΑΚΧΑΡΑ - tests για ανίχνευση της γλυκόζης

- Αναγωγή $\text{Cu}^{2+} \rightarrow \text{Cu}^+$. (δια/μα Fehling)
(ή $\text{Ag}^+ \rightarrow \text{Ag}^\circ$ (δια/μα Tollens))
σε αλκαλικό περιλον



ΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΤΟΥ ΓΛΥΚΟΓΟΝΟΥ (ή γλυκογονόλυση)



Η Φωσφορυλάση
του γλυκογόνου
ελευθερώνει μονάδες
1-P-γλυκόζης






FIGURE 22.13 The glycogen phosphorylase reaction.

Η Φωσφορυλάση του γλυκογόνου αφαιρεί ένα κατάλοιπο γλυκόζης από το γλυκογόνο με φωσφορόλυση



ΥΔΡΟΛΥΣΗ





ΦΩΣΦΟΡΟΛΥΣΗ



ΦΩΣΦΟΡΙΚΗ ΠΥΡΙΔΟΞΑΛΗ (PLP) (παράγωγο της βιταμίνης B6)


Είναι το συνένζυμο της φωσφορυλάσης του γλυκογόνου

■ Η ΦΩΣΦΟΡΙΚΗ ΠΥΡΙΔΟΞΑΛΗ (PLP) συνδέεται ομοιοπολικά μέσω μίας Lys στο ενεργό κέντρο της φωσφορυλάσης



Ομοιοπολική δέσμευση PLP σε Lys ενζύμου

Φωσφορυλάση του γλυκογόνου




Η φωσφορυλάση του γλυκογόνου **σταματάει** όταν βρει 4 κατάλοιπα γλυκόζης από καποιο σημείο διακλάδωσης $\alpha(1 \rightarrow 6)$.

$\alpha(1 \rightarrow 6)$ Γλυκοσιδάση


Η φωσφορυλάση του γλυκογόνου ΔΕΝ μπορεί να διασπάσει τον $\alpha(1 \rightarrow 6)$ δεσμό. Σταματάει όταν βρει 4 κατάλοιπα γλυκόζης πριν από το σημείο διακλάδωσης $\alpha(1 \rightarrow 6)$.

Τη διάσπαση των $\alpha(1 \rightarrow 6)$ δεσμών αναλαμβάνει η $\alpha(1 \rightarrow 6)$ Γλυκοσιδάση (με υδρόλυση)




ΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΤΟΥ ΓΛΥΚΟΓΟΝΟΥ - στάδια


A.



B.



C.



Μετατροπή 1-P-γλυκόζης σε 6-P-γλυκόζη

- Μια μουτάση ανταλλάσει
- (-PO₃²⁻) - ομάδες μεταξύ
- ενζύμου-υποστρώματος




(Γλυκογόνο)_v + Pi

Φωσφορυλάση
του γλυκογόνου

G-1-P + (Γλυκογόνο)_{v-1}


Φωσφο-
γλυκομουτάση

G-6-P



- Η αντίδραση είναι παρόμοια με τη μετατροπή του 3-φωσφογλυκερικού σε 2-φωσφογλυκερικού)

- Η φωσφορολυτική διάσπαση του γλυκογόνου είναι ενεργειακά συμφέρουσα γιατί το παραγόμενο σάκχαρο ($G-1-P$) είναι ήδη φωσφορυλιωμένο.
- **Δεν καταναλώνεται ATP.**
- Επιπλέον, η $G-6P$ δεν μπορεί να διαχυθεί έξω από τα μυϊκά κύτταρα.




Εικόνα 21.10 Δομή της

φωσφορυλάσης *a* και της φωσφορυλάσης *b*. Η φωσφορυλάση *a* φωσφορυλώνεται στη σερίνη 14 κάθε υπομονάδας. Η τροποποίηση αυτή ευνοεί τη δομή της πλέον ενεργού κατάστασης *R*. Η μία υπομονάδα φαίνεται με λευκό και οι έλικες και θηλιές, που είναι σημαντικές για τη ρύθμιση, με μπλε και κόκκινο. Η άλλη υπομονάδα φαίνεται με κίτρινο και οι ρυθμιστικές δομές με πορτοκαλί και πράσινο. Η φωσφορυλάση *b* δεν φωσφορυλώνεται και υπάρχει κυρίως στην κατάσταση *T*. Παρατηρήστε ότι τα καταλυτικά κέντρα είναι μερικώς φραγμένα στην κατάσταση *T*. [Σχεδιασμένο από 1GPA. pdb και 1NOJ.pdb.]


Φωσφορυλάση *a* (στην κατάσταση *R*)Φωσφορυλάση *b* (στην κατάσταση *T*)

▪ ΦΩΣΦΟΡΥΛΑΣΗ ΤΟΥ ΓΛΥΚΟΓΟΝΟΥ - ΔΙΜΕΡΕΣ




- ΦΩΣΦΟΡΥΛΑΣΗ ΤΟΥ ΓΛΥΚΟΓΟΝΟΥ
- φωσφορυλιωμένη (α -) και μη-φωσφορυλιωμένη μορφή (β -μορφή)

Φωσφορυλάση a



α - μορφή
(φωσφορυλιωμένη)
ΕΝΕΡΓΗ




β -μορφή
(μη-φωσφορυλιωμένη)
ΑΝΕΝΕΡΓΗ

Φωσφορυλάση b

α - & β - μορφές : **Carl. & Gerti CORI (1935)**

α -Ser14(P) : **Edwin Krebs & E. Fischer-Nobel Prize Physiology /Medicine in 1992**

▪ φωσφορυλίωση της Ser-14




Η φωσφορυλίωση της Ser-14 προκαλεί μετατόπιση του Ν-τελικού άκρου (αα 10-22) προς τη διεπιφάνεια των δυο υπομονάδων και αλλάζει την προσβασιμότητα του ενεργού κέντρου

Figure 15-34
Lehninger Principles of Biochemistry, Fifth Edition
© 2008 W.H. Freeman and Company

- **ΦΩΣΦΟΡΥΛΑΣΗ ΤΟΥ ΓΛΥΚΟΓΟΝΟΥ**
- **Απαντά σε δύο διαμορφώσεις (T- & R-)**

T (tense)


Το ενεργό κέντρο είναι λιγότερο προσβάσιμο (Asp283), και άρα μειωμένη αγχιστεία για το υπόστρωμα (Pi)




Κατάσταση T

R (relaxed)

Ενεργό κέντρο προσβάσιμο
Λόγω μετακίνησης μιας Arg αποκτά μεγαλύτερη αγχιστεία για το υπόστρωμα (Pi)



Κατάσταση R



Οι ορμόνες ΕΠΙΝΕΦΡΙΝΗ
(στους μυες) και ΓΛΥΚΑΓΟΝΗ (στη ήπαρ)
ενεργοποιούν
τον ίδιο καταρράκτη μια σειράς κινάσων και
σηματοδοτούν
την ανάγκη αποικοδόμησης του γλυκογόνου
στο ήπαρ και τους μυες αντίστοιχα.

Ο καταράκτης που ξεκινάει με
το cAMP (2^o σήμα) έχει ως
αποτέλεσμα την απελευθέρωση
γλυκόζης από το ήπαρ και
γλυκόλυσης στους μύες.

Figure 15-37


Lehninger Principles of Biochemistry, Sixth Edition

© 2013 W. H. Freeman and Company

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ Η ΤΗ ΝΗΣΤΕΙΑ


Γλυκαγόνη (ήπαρ)
επινεφρίνη (μυς και ήπαρ)

Αδενολική
κυκλάση




Εικόνα 21.19 του μεταβολισμός εν μέρει, από κυκλικής AMP αλληλουχία τη στην ενεργού του γλυκογόνινης Α απενεργοποίηση του γλυκογόνου σύνθεση γλυκοζης

Εικόνα 21.19 Συντονισμένος έλεγχος του μεταβολισμού του γλυκογόνου. Ο μεταβολισμός του γλυκογόνου ρυθμίζεται, εν μέρει, από τους καταρράκτες της κυκλικής AMP με ορμονικό έναυσμα. Η αλληλουχία των αντιδράσεων που οδηγεί στην ενεργοποίηση της πρωτεΐνικής κινάσης Α τελικά ενεργοποιεί την αποκοδόμηση του γλυκογόνου. Ταυτόχρονα, η πρωτεΐνική κινάση Α απενεργοποιεί επίσης τη συνθάση του γλυκογόνου, καταστέλλοντας τη σύνθεση γλυκογόνου.




Κινάση της φωσφορυλάσης ($\alpha\mu\theta\beta\mu\theta\gamma\kappa\alpha\delta\mu\theta$)₄

- Αποτελείται από 3 ρυθμιστικές (α, β, δ) και μια καταλυτική (γ) υπομονάδα
- Μέγιστη ενεργοποίηση επιτυγχάνεται, όταν η **β-υπομονάδα** είναι φωσφορυλιωμένη **KAI** υπάρχει **πρόσδεση Ca^{2+}** στην υπομονάδα-δ



ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΦΩΣΦΟΡΥΛΑΣΗ ΓΛΥΚΟΓΟΝΟΥ



Η φωσφορυλαση του γλυκογόνου υπόκειται

α) Σε ορμονικό (κίναση φωσφορυλασης),
(α-, β- μορφή)
και

β) Αλλοστερικό έλεγχο (ισορροπία T <-> R)

Αλλοστερικός έλεγχος από

α) AMP σε ΜΥΕΣ και

β) ΓΛΥΚΟΖΗ σε ΗΠΑΡ

ΦΩΣΦΟΡΥΛΑΣΗ ΓΛΥΚΟΓΟΝΟΥ ΤΩΝ ΜΥΩΝ

Η μετάβαση της μεταξύ των T και R διαμορφώσεων εξαρτάται από την ενεργειακή κατάσταση του μυϊκού κυττάρου.

Υπό φυσιολογικές συνθήκες

(ή μύες σε ανάπταση, $\text{ATP} \uparrow$ ή $\text{G-6P} \uparrow$)

φωσφορυλάση-β στην T-διαμόρφωση


Με τη άσκηση $\rightarrow \text{AMP} \uparrow$

μετάβαση της φωσφορυλάσης β σε R-διαμόρφωση

Και έκκριση ΕΠΙΝΕΦΡΙΝΗΣ που επάγει την φωσφορυλάση α
 \rightarrow ενεργοποίηση

ΦΩΣΦΟΡΥΛΑΣΗ ΤΟΥ ΓΛΥΚΟΓΟΝΟΥ – ΡΥΘΜΙΣΗ (ΜΥΕΣ)

- ΣΕ ΜΥΕΣ
- β-μορφή
- απόκριση σε AMP, ATP & G6P





Phosphorylase b
(*un-phosphorylated*)

ΦΩΣΦΟΡΥΛΑΣΗ ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΣ

- Η ηπατική φωσφορυλάση ΔΕΝ ρυθμίζεται από το AMP (αλλά από τη γλυκόζη), γιατί στο ήπαρ δεν συμβαίνουν μεγάλες ενεργειακές αλλαγές, όπως στους μύες
- Η ηπατική φωσφορυλάση-α είναι μετατοπισμένη σε (δραστική) R-διαμόρφωση. Η δέσμευση της γλυκόζης την μετατοπίζει σε T-διαμόρφωση (απ-ενεργοποίηση).
- Αν υπάρχει αρκετή γλυκόζη (τροφή), δεν υπάρχει λόγος να χρησιμοποιηθεί το γλυκογόνο.


ΓΛΥΚΑΓΟΝΗ

T
(ανενεργή)




R
(ενεργή)

**Phosphorylase a
(phosphorylated form)**



- **ΗΠΑΡ**
ΚΥΡΙΩΣ α-μορφή
απόκριση σε γλυκόζη
Και σε ορμόνες
ΓΛΥΚΑΓΟΝΗ και
ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ

Η επινεφρίνη (και η γλυκαγόνη)
Ρυθμίζουν την ενεργοποίηση της
φωσφορυλάσης του γλυκογόνου,
(όχι μόνο) με ενεργοποίηση της
φωσφορυλίωσής της,
αλλά και
με απενεργοποίηση της
απο-φωσφορυλίωσής της.




Ο ίδιος καταρράκτης του cAMP
φωσφορυλιώνει και ενεργοποιεί την PKA
ενώ φωσφορυλιώνει και
απενεργοποιεί το ένζυμο PPI

Figure 15-37
Lehninger Principles of Biochemistry, Sixth Edition
 © 2013 W. H. Freeman and Company

ΟΡΜΟΝΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ PP1 (PP1 = phosphoprotein phosphatase 1) από την επινεφρίνη (ή τη γλυκαγόνη)


Ο καταρράκτης της cAMP (ενεργοποίηση της PKA) φωσφορυλώνει και απενεργοποιεί το ένζυμο phosphoprotein phosphatase 1 ή **PP1**



Η (PKA-εξαρτώμενη) φωσφορυλίωση της ρυθμιστικής υπομονάδας (R_{GL}) της PP1 σε μία θέση αποκλείει την αλληλεπίδρασή της με την καταλυτική της υπομονάδα καθιστώντας την ανενεργή


Η ελεύθερη καταλυτική υπομονάδα της PP1 στο κυτταρόπλασμα αναστέλλεται επιπλέον με αλληλεπίδραση με τον φωσφορυλιωμένο (ενεργό) αναστολέα της (I-P).

Η επινεφρίνη ΚΑΙ η γλυκαγόνη (μεσω cAMP) ρυθμίζουν τη φωσφορυλίωση (και άρα την ενεργοποίηση) της Φωσφορυλάσης, όχι μόνο με ενεργοποίηση της φωσφορυλίωσής της, αλλά και με απενεργοποίηση της απο-φωσφορυλίωσής της.



Η ινσουλίνη σηματοδοτεί την αναστολή της αποικοδόμησης του γλυκογόνου (με ενεργοποίηση της PP1)

Αυξηση επιπέδων γλυκόζης στο αίμα :




Μηχανισμός:

Η ινσουλίνη ενεργοποιεί μία άλλη κινάση

(όχι την PKA), η οποία φωσφορυλιώνει τη ρυθμιστική υπομονάδα (R_{GL}) της PP1 σε

άλλη θέση, από ότι η PKA

με αποτέλεσμα την ενεργοποίηση της PP1




Ενεργοποίηση της Protein Phosphatase 1 (PP1) =

Αναστολή της αποικοδόμησης του γλυκογόνου,
λόγω απενεργοποίησης της φωσφορυλάσης του.


Αναστολή της αποικοδόμησης του γλυκογόνου

Η δέσμευση γλυκόζης στην φωσφορυλάση α του ήπατος προκαλεί τη μετατόπιση της στην Τ διαμόρφωση ($R \rightarrow T$)



Η PP1 δρα μόνο όταν η φωσφορυλάση α βρεθεί στην Τ-διαμόρφωση, με δέσμευση της γλυκόζης.

Η δεσμευμένη PP1 αποφωσφορυλιώνει την φωσφορυλάση α → φωσφορυλάση-β (ανενεργή) \rightarrow αναστολή της αποικοδόμησης





R
Φωσφορυλάση-α
ΕΝΕΡΓΟΣ

T
Φωσφορυλάση-α

Φωσφορυλάση- β
AN-ΕΝΕΡΓΟΣ

ΗΠΑΡ


ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΟΡΜΟΝΩΝ ΣΕ ΔΡΑΣΗ PP1



Ο ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΛΥΚΟΓΟΝΟΥ


- **ΓΛΥΚΟΓΟΝΟ** : Διακλαδισμένο μόριο καταλοίπων γλυκόζης ενωμένα με α(1-4) γλυκοζιτικούς δεσμούς και α(1-6) γλυκοζιτικούς δεσμούς στις διακλαδώσεις.
- **Η αποικοδόμησή του οδηγεί σε μονάδες 1-P-γλυκόζης, μέσω δράσης 3 ενζύμων** : φωσφορυλάση γλυκογόνου, μιας τρασφεράσης και της α(1-6) γλυκοσιδάσης.
- **Η φωσφορική πυριδοξάλη PLP** είναι το συνένζυμο της φωσφορυλάσης
- **Η ινσουλίνη** σταματάει την αποικοδόμηση του γλυκογόνου,
- **ενώ η γλυκαγόνη και η επινεφρίνη** την επάγουν
- **Η φωσφορυλάση του γλυκογόνου** ρυθμίζεται **օρμονικά** (με δραση ινσουλίνης, γλυκαγόνης, & επινεφρίνης) και **αλλοστερικά** (γλυκόζη, AMP).
- Η δράση της φωσφορυλάση ελέγχεται και από 2 ένζυμα :
- **την κιναση της φωσφορυλασης και την PPI φωσφαταση**
- **Στο ήπαρ επικρατεί** η (φωσφορυλιωμένη) **ενεργός μορφή-α**,
- **ενω στους μύες σε ηρεμία**
- η ανενεργός (κυρίως) μη-φωσφορυλιωμένη μορφή β

Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΓΛΥΚΟΓΟΝΟΥ




Η ΣΥΝΘΑΣΗ ΤΟΥ ΓΛΥΚΟΓΟΝΟΥ

καταλύει τη μεταφορά ενός καταλοίπου UDP-γλυκόζης,
σε ένα μη-αναγωγικό άκρο
ενός μορίου γλυκογόνου.




ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΓΛΥΚΟΓΟΝΟΥ – σταδιά


A. Σύνθεση 1-P-Glycose





B. Σύνθεση UDP-Glycose



C. Δράση συνθάσης





UDP-glucose
(a sugar nucleotide)




Luis Leloir, 1906–1987

Ουριδινο-διφωσφορικη-γλυκοζη

Μεταβολισμός της γαλακτόζης

Η UDP-γλυκόζη
χρησιμοποείται
και στο μεταβολισμό²⁻
της γαλακτόζης

Όπου και
ανακυκλώνεται



**Η ΣΥΝΘΑΣΗ, ΌΠΩΣ ΚΑΙ Η ΦΩΣΦΟΡΥΛΑΣΗ ΤΟΥ ΓΛΥΚΟΓΟΝΟΥ
ΔΡΟΥΝ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΑ ΜΗ-ΑΝΑΓΩΓΙΚΑ ΑΚΡΑ**

Η συνθάση του γλυκογόνου προσθέτει
κατάλοιπα γλυκόζης (ως UDP-glucose)
ΜΟΝΟΝ, οταν
η αλυσίδα (του γλυκογόνου) περιέχει ήδη
τουλάχιστον 4 κατάλοιπα.

Ομως πως αρχίζει η σύνθεση του γλυκογόνου ;

Η εκκίνηση της σύνθεσης του
γλυκογόνου γίνεται με τη
γλυκοζυλιωση της πρωτεΐνης
ΓΛΥΚΟΓΕΝΙΝΗΣ στην Tyr-194





FIGURE 15-34 Glycogenin structure. Muscle glycogenin (M_r 37,000) forms dimers in solution. Humans have a second isoform in liver, glycogenin-2. The substrate, UDP-glucose, is bound to a Rossmann fold near the amino terminus



Η εκκίνηση της σύνθεσης της αλυσίδας γίνεται αυτοκαταλυτικά από την πρωτεΐνη ΓΛΥΚΟΓΕΝΙΝΗ με την προσθήκη 8 μονάδων UDP-γλυκόζης στην Tyr-194

Στη συνέχεια αναλαμβάνει η συνθάση και το ενζυμο της διακλάδωσης





Figure 15.53 Glycogenin provides a primer for glycogen synthesis by glycogen synthase.



**Το ένζυμο διακλάδωσης
(ή γλυκοζυλο-τρανσφεράση)
σχηματίζει τις α(1-6) διακλαδώσεις**


- **Το ένζυμο διακλάδωσης δημιουργεί ένα καινούργιο κλάδο μεταφέροντας 6-7 καταλοίπων από ένα μη-αναγωγικό άκρο με τουλάχιστον 11 κατάλοιπα στον C6 μιας γλυκόζης.**

Οι θεσεις διακλάδωσης απέχουν τουλαχιστον 4 καταλοιπα γλυκοζης μεταξυ τους.

Figure 15.52 Concerted action of glycogen synthase and glycogen branching enzyme is required for glycogenesis.

Textbook of Biochemistry with Clinical Correlations, 7e edited by Thomas M. Devlin © 2011 John Wiley & Sons, Inc.


Εικόνα 21.17 Αντίδραση σχηματισμού διακλαδώσεων. Το ένζυμο σχηματισμού διακλαδώσεων απομακρύνει έναν ολιγοσακχαρίτη περίπου επτά καταλοίπων από το μη αναγωγικό άκρο και δημιουργεί έναν εσωτερικό γλυκοζιτικό δεσμό α -1,6.




Η συνθάση επεκτείνει και τα δύο μη αναγωγικά άκρα με επακόλουθο τον σχηματισμό περισσότερων διακλαδώσεων

Οι διακλαδώσεις ειναι σημαντικές διότι :


- 1. Αυξάνουν την διαλυτότητα του γλυκογόνου**
- 2. Δημιουργούν μεγάλο αριθμό τελικών καταλοίπων και επομένως αυξάνουν τις θέσεις δράσης της φωσφορυλάσης και της συνθάσης.**



ΣΥΝΘΑΣΗ ΓΛΥΚΟΓΟΝΟΥ : α- και β-μορφή



β-μορφή: Φωσφορυλιωμένη
ΜΗ-δραστικη



α-μορφή: Μη-φωσφορυλιωμένη
Δραστική (**ACTIVE**)


ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΘΑΣΗΣ ΓΛΥΚΟΓΟΝΟΥ με φωσφορυλίωση-αποφωσφορυλίωση

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ή ΤΗ ΝΗΣΤΕΙΑ


Γλυκαγόνη (ήπαρ)

επινεφρίνη (μυς και ήπαρ)

Αδενυλική
κυκλάση



Εικόνα 21.19 Συντονισμένος έλεγχος του μεταβολισμού του γλυκογόνου. Ο μεταβολισμός του γλυκογόνου ρυθμίζεται, εν μέρει, από τους καταρράκτες της κυκλικής AMP με ορμονικό έναυσμα. Η αλληλουχία των αντιδράσεων που οδηγεί στην ενεργοποίηση της πρωτεΐνικής κινάσης Α τελικά ενεργοποιεί την αποικοδόμηση του γλυκογόνου. Ταυτόχρονα, η πρωτεΐνικη κινάση Α απενεργοποιεί επίσης τη συνθάση του γλυκογόνου, καταστέλλοντας τη σύνθεση γλυκογόνου.



Εικόνα 21.19 του μεταβολισμού του γλυκογόνου στην ενεργοποίηση της πρωτεΐνικής κινάσης Α απενεργοποιεί τη σύνθεση γλυκογόνου.

Συνθάση β → Φωσφορυλιωμένη συνθάση → ΑΝΕΝΕΡΓΟΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ :

Η φωσφορυλίωση έχει αντίθετο αποτέλεσμα

στη δράση της συνθάσης από ότι

στη φωσφορυλάση του γλυκογόνου.

Επιπλέον, η συνθάση


(σε αντίθεση με τη φωσφορυλάση)

φωσφορυλιώνεται σε πολλές θέσεις και από

διαφορετικές κινάσες.

ΚΙΝΑΣΕΣ που συμμετεχουν σε ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ συνθάσης και τα 2^α μηνυματα απο τα οποία ελέγχονται.

Συνεργειακή και ιεραρχική φωσφορυλίωση (απενεργοποίηση)



Τουλάχιστον 9 θέσεις φωσφορυλίωσης (σε Ser)
σε Ν- και C-τελικά άκρα, που καταλύονται από διαφορετικές κινάσες. .

- cAMP-εξαρτώμενη κινάση (AMPK)
- Ca²⁺-εξαρτώμενη κινάση (CaMK1)
- Πρωτεϊνική κινάση-3 (PKC)
(διακυλογλυκερόλη-εξαρτώμενη)
- Κινάσες καζεΐνης (I & II)

Figure 15.55 Regulation of glycogen synthase by covalent modification.

Textbook of Biochemistry with Clinical Correlations, 7e edited by Thomas M. Devlin © 2011 John Wiley & Sons, Inc.

Η ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ (ήπαρ και σκελετικοι μυες)

1. Απ-ενεργοποιηση της GSK3 (Κινάση της συνθάσης-3)
2. Ενεργοποιηση της PP1
3. Ενεργοποιηση της συνθάσης
4. Κινητοποιηση των GLUT1, GLUT4





Fig. 22.7 Garrett-Grisham

Η ανταγωνιστική δράση της ινσουλίνης και της επινεφρίνης στη δράση της PP1 και στο μεταβολισμό του γλυκογόνου.



Protein Phosphatase 1 (PP1)

- Αντιστρέφει την επίδραση των κινασών στη συνθαση και τη φωσφορυλάση του γλυκογόνου.
- Μειώνει τον ρυθμό αποικοδόμησης του γλυκογόνου με αποφωσφορυλιωση της :
 - κινάσης της φωσφορυλάσης και της
 - φωσφορυλάσης α
- Επαγει τη σύνθεση του γλυκογόνου με μετατροπή της συνθάσης β του γλυκογόνου (ανενεργή) σε α (ενεργή).






Fig. 6. Protein phosphatase-1 (PP1).



Γλυκαγόνη, Επινεφρίνη
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ της PP1
Και Ενεργοποίηση της PKA


Ινσουλίνη
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ PP1

Η γλυκόζη στο αίμα ρυθμίζει το μεταβολισμό του γλυκογόνου στο ήπαρ



Οι 2 δρασεις της φωσφορυλασης και της συνθασης
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΕΝΕΡΓΕΣ



Glycogen granule




Ο αισθητήρας της γλυκόζης στο αίμα
ειναι η φωσφορυλάση α του ήπατος

- (1) Η δέσμευση γλυκόζης στην φωσφορυλάση α του ήπατος τη μετατρέπει από την R (ενεργό) στην T (ανενεργό μορφή) και η PP1 απελευθερωνεται από το σύμπλοκο
- (2) Η (απελευθερωμένη από τη φωσφορυλάση) PP1 μπορεί να δράσει
 - 2^{α)} και να αποφωσφορυλιώσει την φωσφορυλάση α σε φωσφορυλάση-β (→ανενεργή φωσφορυλάση)
 - 2^{β)} και να αποφωσφορυλιώσει τη συνθάση

→ ΕΝΕΡΓΗ ΣΥΝΘΑΣΗ



ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΦΩΣΦΟΡΥΛΑΣΗ ΓΛΥΚΟΓΟΝΟΥ



Η φωσφορυλαση του γλυκογόνου υπόκειται

α) Σε ορμονικό (κίναση φωσφορυλασης),
(α-, β- μορφή)
και

β) Αλλοστερικό έλεγχο (ισορροπία T <-> R)


Αλλοστερικός έλεγχος από

α) AMP σε ΜΥΕΣ και

β) ΓΛΥΚΟΖΗ σε ΗΠΑΡ


Αναστολή της αποικοδόμησης του γλυκογόνου

Η δέσμευση γλυκόζης στην φωσφορυλάση α του ήπατος προκαλεί τη μετατόπιση της στην Τ διαμόρφωση ($R \rightarrow T$)



Η PP1 δρα μόνο όταν η φωσφορυλάση α βρεθεί στην Τ-διαμόρφωση, με δέσμευση της γλυκόζης.

Η δεσμευμένη PP1 αποφωσφορυλιώνει την φωσφορυλάση α
→ φωσφορυλάση-β (ανενεργή) → αναστολή της αποικοδόμησης



R
Φωσφορυλάση-α
ΕΝΕΡΓΟΣ

T
Φωσφορυλάση-α


Φωσφορυλάση- β
ΑΝ-ΕΝΕΡΓΟΣ

ΗΠΑΡ

Η σύνθεση και η αποκοδόμηση του γλυκογόνου ρυθμίζονται συντονισμένα, αλλά αντίστροφα


από έναν ενισχυτικό καταρράκτη αντιδράσεων με ορμονικό έναυσμα
έτσι ώστε

**Η συνθάση να είναι ανενεργός, όταν η φωσφορυλάση
είναι ενεργός και αντίστροφα**




ήπαρ

Ο ίδιος καταρράκτης αντιδράσεων του cAMP, που ρυθμίζε τη σύνθεση και αποικοδόμηση του γλυκογόνου, ρυθμίζει και την ανταγωνιστική δράση της γλυκόλυσης – γλυκονεογένεσης στο ήπαρ (Ορμονική- ομοιοπολική ρύθμιση)



↑Γλυκόζη/Ινσουλίνη

ΗΠΑΡ



↓FBPase2 και ↑PFK2

↑F-2P₆P



↑PFK



↑Γλυκόλυσης

↓ Γλυκόζης/ ΝΗΣΤΕΙΑ

Έκκριση γλυκαγόνης



Prot. Kinase A (PKA) *



Φωσφορυλίωση του ενζύμου



↑FBPase2 και ↓PFK2



↓F-2P₆P




↓PFK



↓ Γλυκόλυσης

Glucose-6-P → Glucose-1-P (μουτάση)



Άρα, 1 ATP υδρολύεται για ενσωμάτωση G-6P σε γλυκογόνο

Σημ. 1 ATP απαιτείται επίσης για κάθε μετατροπή καθε μορίου glucose προς glucose -6-P (μέσω της εξοκινάσης)


ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΟΣΤΟΣ της ΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗΣ του ΓΛΥΚΟΓΟΝΟΥ

90% του γλυκογόνου διασπάται φωσφορολυτικά σε glucose-1-P (μέσω φωσφορυλάσης)

Η glucose -1-P μετατρέπεται σε glucose -6-P (μέσω μουτάσης)

Τα κατάλοιπα των διακλαδώσεων (10% συνόλου) διασπάται υδρολυτικά σε glucose, μέσω $\alpha(1 \rightarrow 6)$ γλυκοσιδάσης

Η glucose μετατρέπεται σε glucose -6-P, μέσω της εξοκινάσης (γλυκόλυση, υδρόλυση 1 ATP).



**Το γλυκογόνο είναι μια αποδοτική μορφή αποθήκευσης
της γλυκόζης**

**1 ATP υδρολύεται για ενσωμάτωση κάθε μορίου G-6P σε γλυκογόνο
και**

30 ATP αποδίδονται από πλήρη οξείδωση μιας glucose-6-P

**Άρα, 29 ATP (= 97%) η συνολικη απόδοση αποθήκευσης
μιας G-6P σε γλυκογόνο**


Carl and Gerty Cori

Nobel Prize Physiology-Medicine

1947



Carl Cori. Photo courtesy of the National Library of Medicine.



Gerty Cori. Photo courtesy of the National Library of Medicine.

Carbohydrate Metabolism: Glycogen Phosphorylase and the Work of Carl F. and Gerty T. Cori

The Mechanism of Epinephrine Action. II. The Influence of Epinephrine and Insulin on the Carbohydrate Metabolism of Rats in the Postabsorptive State
(Cori, C. F., and Cori, G. T. (1928) *J. Biol. Chem.* 79, 321-341)

The Enzymatic Conversion of Glucose-1-phosphoric Ester to 6-Ester in Tissue Extracts
(Cori, G. T., Colowick, S. P., and Cori, C. F. (1938) *J. Biol. Chem.* 124, 543-555)


The Activity of the Phosphorylating Enzyme in Muscle Extracts
(Cori, G. T., Colowick, S. P., and Cori, C. F. (1939) *J. Biol. Chem.* 127, 771-782)

Crystalline Muscle Phosphorylase. I. Preparation, Properties, and Molecular Weight
(Green, A. A., and Cori, G. T. (1943) *J. Biol. Chem.* 151, 21-29)

Crystalline Muscle Phosphorylase. II. Prosthetic Group
(Cori, G. T., and Green, A. A. (1943) *J. Biol. Chem.* 151, 31-38)

- Ανακάλυψη φωσφορυλασης γλυκογόνου και μηχανισμού φωσφορόλυσης σε μυες, και ρύθμιση της από AMP.
- Ταυτοποιηση 1-P-γλυκόζης (cori ester)

•ΣΕ ΜΥΕΣ
•β-μορφή
απόκριση σε AMP, ATP & G6P



Κληρονομικές ασθένειες που σχετίζονται με την αποθήκευση του γλυκογόνου στο ήπαρ (Dr. Gerty Cori)

Πίνακας 21.1 Νόσοι αποθήκευσης γλυκογόνου

Τύπος	Ένζυμο που λείπει	Όργανο που προσβάλλεται	Γλυκογόνο στο όργανο που προσβάλλεται	Κλινικά χαρακτηριστικά
I ΝΟΣΟΣ VON GIERKE	Φωσφατάση της 6-φωσφορικής γλυκόζης	Ήπαρ και νεφροί	Αυξημένη ποσότητα, κανονική δομή.	Διογκωμένο ήπαρ. Αδυναμία ανάπτυξης. Πολύ σοβαρή υπογλυκαιμία, κέτωση, υπερουρικαιμία, υπερλιπιδαιμία.
II ΝΟΣΟΣ ROMPE	α -1,4-Γλυκοζιτάση (λυσοσωματική)	Όλα τα όργανα	Πολύ αυξημένη ποσότητα, κανονική δομή.	Οι ασθενείς πεθαίνουν συνήθως πριν κλείσουν δύο έτη ζωής, από καρδιοαναπνευστική ανεπάρκεια.
III ΝΟΣΟΣ CORI	Αμυλο-1,6-γλυκοζιτάση (ένζυμο αποδιακλάδωσης)	Μύες και ήπαρ	Αυξημένη ποσότητα, μικρές εξωτερικές διακλαδώσεις.	Όπως η τύπου I, με ηπιότερη όμως εξέλιξη.
IV ΝΟΣΟΣ ANDERSEN	Ένζυμο διακλάδωσης (α -1,4 → α -1,6)	Ήπαρ και σπλήνας	Κανονική ποσότητα, πολύ επιμήκεις εξωτερικές διακλαδώσεις.	Σταδιακή κίρρωση του ήπατος. Η προκύπτουσα ηπατική ανεπάρκεια προκαλεί τον θάνατο συνήθως πριν από την ηλικία των δύο ετών.
V ΝΟΣΟΣ McARDLE	Φωσφορυλάση του γλυκογόνου	<u>Μύες</u>	Ελαφρώς αυξημένη ποσότητα, κανονική δομή.	Περιορισμένη δυνατότητα για έντονη άσκηση, λόγω επώδυνων μυϊκών συσπάσεων. Κατά τα άλλα, οι ασθενείς είναι φυσιολογικοί και η ανάπτυξή τους κανονική.
VI ΝΟΣΟΣ HERS	Φωσφορυλάση του γλυκογόνου	<u>ήπαρ</u>	Αυξημένη ποσότητα.	Όπως και η τύπου I, με ηπιότερη όμως πορεία.
VII	Φωσφοφρουκτοκινάση	Μύες	Αυξημένη ποσότητα, κανονική δομή.	Όπως και η τύπου V.
VIII	Κινάση της φωσφορυλάσης	ήπαρ	Αυξημένη ποσότητα, κανονική δομή.	Μικρής έκτασης διόγκωση του ήπατος. Ήπια υπογλυκαιμία.

Σημείωση: Οι τύποι I έως VII κληρονομούνται ως αυτοσωματικοί υπολειπόμενοι. Ο τύπος VIII είναι φυλοσύνδετος.

Η διάσπαση/αποικοδόμηση του γλυκογόνου αποτελεί γρήγορη πηγή παροχής ενέργειας στον οργανισμό, ακόμη και απουσία οξυγόνου .

Η σύνθεσή του αποτελεί έναν ανέξιδο τρόπο αποθήκευσης της γλυκόζης - με κατανάλωση 1 ATP μόνο.
Απόδοση αποθήκευσης, 97%

Τα κύρια ένζυμα μεταβολισμού του γλυκογόνου είναι :

– η φωσφορυλάση και η συνθάση του γλυκογόνου –
τα οποία ρυθμιζονται αλλοστερικά και ορμονικά

Η φωσφορυλάση ρυθμίζεται αλλοστερικά από:

- (a) AMP (φωσφορυλάση των μυών) και τη γλυκόζη του αίματος (φωσφορυλάση του ήπατος)

Οι ορμόνες, αδρεναλίνη (μύες) και γλυκαγόνη (ήπαρ) επάγουν την αποικοδόμηση του γλυκογόνου,
Ενώ, η ινσουλινη επάγει τη σύνθεση του γλυκογόνου.

Η σύνθεση και η αποικοδόμηση του γλυκογόνου ρυθμίζονται συντονισμένα, αλλά αντίρροπα, όπως και η γλυκονεογένεση-γλυκόλυση (μεσω υτηςν συντονισμενης ουθμισσης της PPI)







FIGURE 22.18 The portal vein system carries pancreatic secretions such as insulin and glucagon to the liver and then into the rest of the circulatory system.






НПАР


)

**ΗΠΑΡ****ΜΥΕΣ**

****ΠΡΟΣΟΧΗ! Σε μυες η PFK-2 (και PFK-1) ενεργοποιείται από cAMP (και PKA), και αρα ΓΛΥΚΟΛΥΣΗ***

ΟΡΜΟΝΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΓΛΥΚΟΓΟΝΟΥ





Contents lists available at ScienceDirect

BBA Clinical

journal homepage: www.elsevier.com/locate/bbaclin



Glycogen metabolism in humans☆☆☆



María M. Adeva-Andany *, Manuel González-Lucán, Cristóbal Donapetry-García,
Carlos Fernández-Fernández, Eva Ameneiros-Rodríguez

Nephrology Division. Hospital General Juan Cardona. c/ Pardo Bazán s/n. 15406 Ferrol. Spain


Molecular Aspects of Medicine 46 (2015) 34–45



Contents lists available at ScienceDirect

Molecular Aspects of Medicine

journal homepage: www.elsevier.com/locate/mam



Review

Role of glycogen phosphorylase in liver glycogen metabolism

Loranne Agius *

Institutes of Cellular Medicine and Ageing and Health, Medical School, Newcastle University, Newcastle upon Tyne NE2 4HH, UK

