



# 2<sup>η</sup> ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΕΜΒΡΥΪΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

«Η εβδομάδα των 2»

ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, MD, MSc, PhD  
ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ  
ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ-ΓΕΝΕΤΙΣΤΡΙΑ  
ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑΣ-ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΑΣ



## 2<sup>η</sup> w: Ολοκλήρωση εμφύτευσης βλαστοκύστης στο ενδομήτριο



Σχηματισμός  
δίστιβου εμβρυϊκού  
δίσκου



Επιβλάστη



Υποβλάστη



Σχηματισμός εξω-εμβρυϊκών  
δομών

Αμνιακή  
κοιλότητα



Άμνιο

Χοριακός  
σάκος

Συνδετικός  
Ομφαλικό μίσχος  
κυστίδιο

Προέλευση όλων των  
ιστών & οργάνων

8<sup>η</sup> ημέρα



# ΔΙΣΤΙΒΟΣ ΕΜΒΡΥΪΚΟΣ ΔΙΣΚΟΣ

Από την 8η d:

Η Έσω κυτταρική μάζα


διαφοροποιείται στο δίστιβο  
δίσκο που αποτελείται από 2  
στρώματα:

(A) Επιβλάστη

Υψηλά κυλινδρικά κύτταρα,  
προσκείμενα στην αμνιακή  
κοιλότητα.


(B) Υποβλάστη

Μικρά κυβοειδή κύτταρα,  
προσκείμενα στη κοιλότητα  
της βλαστοκύστης.



## 2<sup>η</sup> w: Ολοκλήρωση εμφύτευσης βλαστοκύστης στο ενδομήτριο

8<sup>η</sup> ημέρα




Διαφοροποίηση τροφοβλάστης

### ΣΥΓΚΥΤΙΟΤΡΟΦΟΒΛΑΣΤΗ

Μάζα ταχέως πολλαπλασιαζόμενων κυττάρων με ασαφή κυτταρικά όρια.

### ΚΥΤΤΑΡΟΤΡΟΦΟΒΛΑΣΤΗ


Σειρά μονοπύρηνων κυττάρων με έντονη μιτωτική δραστηριότητα.



- Παρεκτόπιση κυττάρων ενδομητρίου μέσω πρωτεολυτικών ενζύμων => **απόπτωση.**
- Φαγοκυττάρωση φθαρτικών κυττάρων => πηγή θρεπτικών συστατικών για έμβρυο !!!

# Ενδοκρινική λειτουργία συγκυντιοτροφοβλάστης

- Παραγωγή προγεστερόνης από τη χοληστερόλη της μητέρας.
- Παραγωγή οιστρογόνων.
- Παραγωγή χοριακής γοναδοτροπίνης (hCG).
- Παραγωγή χοριακής σωματοτροπίνης (hCS).
- Παραγωγή χοριακής θυρεοτροπίνης.
- Παραγωγή χοριακής κορτικοτροπίνης.




# Σχηματισμός αμνιακής κοιλότητας

9η ημέρα

- Πριν την ολοκλήρωση της εμφύτευσης, εμφανίζεται εντός της βλαστοκύστης **η αρχέγονη αμνιακή κοιλότητα**.
- Αναπτύσσεται από τους αμνιοβλάστες, κύτταρα της επιβλάστης, όταν αυτά οργανώνονται σε μια λεπτή μεβράνη, **το άμνιο**.

**Επιβλάστη** = έδαφος αμνιακής κοιλότητας.

**Υποβλάστη** = έδαφος εξωκοιλωματικής κοιλότητας.




# Εξω-εμβρυϊκή (εξωκοιλωματική) μεμβράνη ή μεμβράνη του Heuser

Υμένας που σχηματίζεται από κύτταρα που μεταναστεύουν από την υποθλάστη.

- Περιβάλλει τη κοιλότητα της βλαστοκύστης & επενδύει την εσωτερική επιφάνεια της κυτταροτροφοβλάστης.


Κοιλότητα βλαστοκύστης  
+  
Εξωκοιλωματική μεμβράνη  
=  
Πρωτογενές ομφαλικό κυστίδιο ή αρχέγονος λεκιθικός ασκός




# Εξω-εμβρυϊκό μεσόδερμα

Χαλαρός συνδετικός ιστός που σχηματίζεται μεταξύ της έσω επιφάνειας της κυτταροτροφοβλάστης και της εξωτερικής επιφάνειας του αρχέγονου λεκιθικού ασκού και του αμνίου.

- Προέλευση από το εξω-εμβρυϊκό ενδόδερμα του **λεκιθικού ασκού**.
- Αποτελεί υπόστρωμα διαμέσου του οποίου τα αγγεία εφοδιάζουν με οξυγόνο και θρεπτικά συστατικά το έμβρυο.



# Εξω-εμβρυϊκό κοίλωμα



- Προκύπτει όταν κοιλότητες εντός του εξω-εμβρυϊκού μεσοδέρματος συνενώνονται και οδηγούν στο σχηματισμό του **εξω-εμβρυϊκού κοιλώματος** τη 3η w. Η διεύρυνση του εξω-εμβρυϊκού κοιλώματος θα οδηγήσει στο σχηματισμό της χοριακής κοιλότητας.
- Κοιλότητα που περιβάλλει το άμνιο και το ομφαλικό κυστίδιο.
- Καλύπτει την εσωτερική επιφάνεια της κυτταροτροφοβλάστης.

# Εξω-εμβρυϊκό μεσόδερμα

Μέχρι το τέλος της 2<sup>ης</sup> w:


Εξω-εμβρυϊκό  
σωματικό μεσόδερμα

+  
2 στιβάδες  
τροφοβλάστης  
=  
**ΧΟΡΙΟ**

Εξω-εμβρυϊκό  
σπλαχνικό  
μεσόδερμα


The extraembryonic mesoderm lining the **cytotrophoblast** and **amnion** is called the extraembryonic **SOMATOPLEURIC** mesoderm

the lining covering the **yolk sac** is known as the extraembryonic **SPLANCHNOPLEURIC** mesoderm




# Στάδιο κοιλοτήτων

Κατά το σχηματισμό του αμνίου, του εμβρυϊκού δίσκου & του πρωτογενούς ομφαλικού κυστιδίου, στη συγκυτιοτροφοβλάστη εμφανίζονται κενοτόπια => **μεγάλες κοιλότητες**.




Μητρικό αίμα, κυτταρικά υπολείμματα = **Εμβρυοτροφή**  
Είσοδος στον εμβρυϊκό δίσκο μέσω διάχυσης.  
**Πρωτογενής μητροπλακουντιακή κυκλοφορία**

Τη 12<sup>η</sup> ημέρα: γειτονικές κοιλότητες στη συγκυτιοτροφοβλάστη ενώνονται => **αναστομούμενο δίκτυο κοιλοτήτων** (καταβολή μεσολάχνιων χώρων).



# 10-12<sup>η</sup> ημέρα

- Ολοκλήρωση εμφύτευσης στο ενδομήτριο => σχηματισμός ελλείμματος που καλύπτεται από **επιπωματικό πήγμα**.
- Κατά την εμφύτευση, το ενδομήτριο υφίσταται **φθαρτοειδή αντίδραση** => Διόγκωση κυττάρων : εκκριτικά φθαρτικά



# Πρωτογενές ομφαλικό κυστίδιο

7-9<sup>η</sup> d

- Εξω-εμβρυϊκή μεμβράνη
- Κοιλότητα βλαστοκύστης



Πρωτογενές ομφαλικό κυστίδιο ή  
αρχέγονο λεκιθικό ασκό


DAY 9

❖ the **hypoblast** give raise to a  
thin membrane

**THE  
EXOCOELOMIC  
MEMBRANE**

This membrane, together with the hypoblast, lines (The blastocystic cavity) to become


**THE PRIMITIVE  
YOLK SAC**  
**Or exocoelomic cavity**



# Οριστικός λεκιθικός ασκός ή δευτερογενές ομφαλικό κυστίδιο


10-49η d

- Λειτουργικός έως την 4η w.
- **ΡΟΛΟΣ:**
  - Θρέψη.
  - Συμμετοχή στο σχηματισμό του εντέρου, του αναπνευστικού και του γεννητικού συστήματος.
  - Αιμοποίηση.
  - Σύνθεση Afp.
- Προκύπτει όταν το πρωτογενές ομφαλικό κυστίδιο συρρικνώνεται κι αντικαθίσταται από το μικρότερο δευτερογενές.
- Παραμονή του λεκιθικού ασκού μετά τη γέννηση => εκκόλπωμα του Meckel.



# 14<sup>η</sup> ημέρα

- Το έμβρυο, ο αμνιακός σάκος και το ομφαλικό κυστίδιο κρέμεται στη χοριακή κοιλότητα, από το **συνδετικό μίσχο**.



# Εξω-εμβρυϊκές μεμβράνες

AMNIO	Δίστιβο	Αμνιακό επιθήλιο + εξω-εμβρυϊκό σωματικό μεσόδερμα
ΧΟΡΙΑΚΟ ΠΕΤΑΛΟ	Τρίστιβο	Εξω-εμβρυϊκό σωματικό μεσόδερμα + κυτταροτροφοβλάστη + συγκυτιοτροφοβλάστη
ΤΟΙΧΩΜΑ ΛΕΚΙΘΙΚΟΥ ΑΣΚΟΥ	Δίστιβο	Εξω-εμβρυϊκό ενδόδερμα λεκιθικού ασκού + εξω-εμβρυϊκό σπλαχνικό μεσόδερμα

## 2η εβδομάδα: «η εβδομάδα των δύο»

